




ยาฉีดอินซูลินที่มีใช้ในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ชนิดยา (ชื่อยา)	ชื่อการค้า	ลักษณะ/รูปแบบ	รูป	การเก็บรักษา
<p>อินซูลินออกฤทธิ์สั้น (regular insulin, RI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Actrapid HM Humulin R Gensulin R Insugen R Insuman rapid 	<ul style="list-style-type: none"> - สารละลายใส - ความแรง 100 IU/1mL - ขวดแก้ว (vial) ขนาด 10 mL 		<p>ยังไม่เปิดใช้ เก็บในตู้เย็น เปิดใช้แล้ว เก็บในตู้เย็น มีอายุ 1 เดือน</p>
<p>อินซูลินออกฤทธิ์ปานกลาง (Insulin Isophane Suspension, NPH)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Insulatard HM Humulin N Gensulin N Insugen Insuman basal 	<ul style="list-style-type: none"> - น้ำยาแขวนตะกอน - ความแรง 100 IU/1mL - ขวดแก้ว (vial) ขนาด 10 mL 		<p>ยังไม่เปิดใช้ เก็บในตู้เย็น เปิดใช้แล้ว เก็บในตู้เย็น มีอายุ 1 เดือน</p>
<p>อินซูลินผสมสำเร็จรูป - Premixed 30% RI +70% NPH</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mixtard 30 HM Humulin 70/30 Gensulin M30 Insugen 30/70 Insuman combo 30 	<ul style="list-style-type: none"> - น้ำยาแขวนตะกอน - ความแรง RI 30IU/1mL +NPH 70IU/1mL - หลอดแก้ว (cartridge) ขนาด 3 mL 		<p>ยังไม่เปิดใช้ เก็บในตู้เย็น ประกอบหัวเข็มแล้ว เก็บอุณหภูมิห้อง มีอายุ 28 วัน</p>

ยาฉีดอินซูลินที่มีใช้ในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ชนิดยา (ชื่อยา)	ชื่อการค้า	ลักษณะ/รูปแบบ	รูป	การเก็บรักษา
<p>อินซูลินอะนาล็อกออกฤทธิ์ยาว</p> <p>- Insulin glargine</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tojeo • Lantus • Basalin • Glaritus 	<ul style="list-style-type: none"> - สารละลายใส - ความแรง 100 IU/1mL - ขนาด 3 mL บรรจุสำเร็จในปากกาฉีดอินซูลิน ชนิดใช้แล้วทิ้ง 		<p>ยังไม่เปิดใช้ เก็บในตู้เย็น</p> <p>ประกอบหัวเข็มแล้ว เก็บอุณหภูมิห้อง มีอายุ 28 วัน</p>
<p>อินซูลินอะนาล็อกผสมสำเร็จรูป (Biphasic insulin analogue)</p> <p>- Premixed 30% insulin aspart + 70% insulin aspart protamine suspension</p>	<ul style="list-style-type: none"> • NovoMix 30 	<ul style="list-style-type: none"> - น้ำยาแขวนตะกอน - ความแรง insulin aspart 30 IU/1mL +insulin aspart protamine 70 IU/1mL - หลอดแก้ว (cartridge) 		<p>ยังไม่เปิดใช้ เก็บในตู้เย็น</p> <p>ประกอบหัวเข็มแล้ว เก็บอุณหภูมิห้อง มีอายุ 28 วัน</p>