

แนวทางการเลือกใช้ยาทดแทน กรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา กลุ่ม Aromatic Antiepileptic Drug

ผู้ป่วยที่แพ้/มีประวัติแพ้ยากันชักในกลุ่ม Aromatic Epileptic Drug ควรพิจารณาอาการแพ้ของผู้ป่วยร่วมด้วย

อาการแพ้ที่เกิดขึ้น **ไม่รุนแรง**

- ❖ Pruritus
- ❖ RASH, MP RASH
- ❖ Urticaria

อาการแพ้ที่เกิดขึ้น **รุนแรง**

- ♣ Anaphylaxis
- ♣ Drug hypersensitivity
- ♣ Drug rash with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS)
- ♣ Steven Johnson Syndrome
- ♣ Toxic Epidermal Necrolysis

ไม่ควรใช้ ควรเปลี่ยนเป็น กลุ่ม Non-Aromatic Antiepileptic Drug

หากจำเป็นต้องใช้ ควร closely observe อาการ ผิดปกติของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแพ้ข้ามระหว่างยา carbamazepine กับยาในกลุ่ม Aromatic Epileptic Drug ตัวอื่น

ไม่ควรใช้

ควรเปลี่ยนเป็น กลุ่ม Non-Aromatic Antiepileptic Drug

ยาในกลุ่ม Aromatic และ Non- Aromatic Epileptic

กลุ่มยา	รายการยา
Aromatic Epileptic Drug	*Phenytoin, *Carbamazepine, *Phenobarbital, *Lamotrigine, Fosphenytoin, Oxcarbamazepine, Zonisamide
Non - Aromatic Epileptic Drug	*Benzodiazepine, *Gabapentin, *Pregabalin *Topiramate, *Valproic acid, *Clonazepam, *Levetiracetam

*เป็นรายการที่มีใช้ในรพ.พระจอมเกล้า

Ref:

- https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/soqd/admin/news_files/423_18_2.pdf
- <http://pharm.mnrh.go.th:8080/kmir/bitstream/4923124738/24/1/Cross%20reactivity%20drugs.pdf>
- <https://www.udh.go.th/new2016/wp-content/uploads/2020/12/ADR-UDH-Booklet.pdf>
- [https://www.seizure-journal.com/article/S1059-1311\(19\)30188-8/pdf](https://www.seizure-journal.com/article/S1059-1311(19)30188-8/pdf)