

แนวทางการเลือกยาทดแทนกลุ่ม ยาคลายกล้ามเนื้อ

ส่วนใหญ่เป็นการแพ้เฉพาะตัว หรืออาจมีการแพ้ในส่วน of โครงสร้างที่คล้ายกันได้

- * แพ้ Tolperisone/Eperisone ให้ระวังแพ้ข้าม lidocaine
- * แพ้ orphenadrine ให้ระวังแพ้ข้าม Diphenhydramine, Dimenhydrinate

ประเมินความรุนแรงของอาการที่แพ้

ไม่รุนแรง

รุนแรง

Angioedema (ไม่มี
Respiratory
Involve), MP Rash,
Pruritus

Anaphylaxis,
Angioedema (มี
Respiratory
Involve), AGEP,
DRESS, TEN, SJS


นทวนประวัติการใช้ยา
Muscle relaxant
ตัวอื่น ๆ

หลีกเลี่ยงยาที่แพ้และยาที่อยู่ใน
กลุ่มเดียวกัน รวมถึง หลีกเลี่ยง
ยาที่มีโครงสร้างคล้ายกันด้วย
(ภาพล่าง)


เคยใช้ ไม่แพ้

แพ้หรือไม่ทราบ
ข้อมูล


หลีกเลี่ยงยาที่แพ้ พิจารณาใช้ยาตัวที่ผู้ป่วยไม่
แพ้ และเฝ้าระวังอาการแพ้




Lidocaine




Tolperisone





Eperisone



Diphenhydramine



Dimenhydrinate



Orphenadrine

ข้อมูลอ้างอิง

1. https://pharmacy.mahidol.ac.th/DIC/qa_full.php?id=8780
2. Approach to patient with suspected muscle drug relaxant drug allergy. www.thaihp.org